

## Bollettino difesa vite n.01 del 18/04/2012

Le abbondanti piogge degli ultimi giorni possono aver attivato lo sviluppo delle oospore di Peronospora pertanto, con vegetazione recettiva (oltre i 5 cm con prima foglia distesa che si allontana dal germoglio), si consiglia cautelativamente di iniziare la protezione della vegetazione. Altrettanto importante è avviare ora la difesa contro l'Oidio in quanto la vegetazione rimane bagnata sia per la pioggia che per l'elevata umidità.

### DIFESA

**Peronospora:** Si consiglia di effettuare un trattamento cautelativo impiegando prodotti di copertura quali DITIANON, METIRAM, PROPINEB, prodotti RAMEICI. In caso di rischio elevato, per esempio vigneto già fortemente attaccato nella passata stagione, è preferibile usare formulati che contengano principi attivi citotropici (Cimoxanil, Dimetomorf, Zoxamide, Ciazofamid) in miscela con i prodotti di copertura di cui sopra.

**Oidio:** Dalla fase di germogliamento, negli impianti fortemente colpiti nella scorsa stagione e sulle varietà sensibili, Chardonnay, Inzolia, Nero d'Avola, Frappato, intervenire preferibilmente con prodotti a base di ZOLFO o con *Ampelomyces quisqualis* (solo con infezioni leggere, esempio 3-4% della lamina fogliare). In questa fase possono essere impiegati prodotti tipo Meptildinocap, Bupirimate che presentano il vantaggio di avere una maggiore persistenza (intervallo di sicurezza di 8-10 giorni) ed una minore dilavabilità in caso di pioggia, rispetto allo zolfo.

Dr. Felice Capraro