

I.R.V.O.S. Unità Operativa di Noto

Bollettino sulla situazione fitosanitaria in vigneti della Sicilia sud-orientale  
dell' 31.07.2013

**Areale comune di Siracusa. Le osservazioni hanno riguardato il vitigno Moscato b.**

Fase fenologica: Inizio maturazione.

Monitoraggio della tignoletta dell'uva: Continuano le catture del lepidottero nelle trappole a feromone , ma al momento non si ritiene necessario effettuare nessun trattamento.

Oidio: Leggera presenza di oidio, non più attivo, sui grappoli.

Peronospora: presenti sporadiche "macchie d'olio", ormai necrotizzate, su foglie. Non si ritiene necessario effettuare trattamenti.

**Areale comune di Noto. Le osservazioni hanno riguardato i vitigni Nero d'Avola e Moscato b.**

Fase fenologica: Piena invaiatura.

Monitoraggio della tignoletta dell'uva :Nessuna presenza del lepidottero rilevata nelle trappole a feromone; non si consigliano interventi.

Oidio: E' stata rilevata presenza della fitopatia sui grappoli(soprattutto sul Nero D'avola), ma il patogeno appare poco attivo probabilmente a causa delle alte temperature registrate in questa settimana.

Peronospora: Non è stata rilevata presenza della fitopatia.

**Areale comuni di Vittoria (C/da Favaraggi) ed Acate (C/da Fontane). Le osservazioni hanno riguardato i vitigni Frappato e Nero d'Avola.**

Fase fenologica: La fase di invaiatura procede normalmente sul Nero D'Avola , mentre appare più rallentata sul Frappato.

Monitoraggio della tignoletta dell'uva: nessuna cattura sulle trappole a feromoni.

Oidio: non è stata rilevata presenza della fitopatia.

Peronospora: Non è stata evidenziata presenza della fitopatia.

.